DiarreeStop 50 g | 50 g

Manufacturer	cdVet
Product number	1175
Weight	0.05kg
Length	45mm
Width	45mm
Height	68mm



Product description

Dieet aanvullend diervoeder (poeder, capsules) voor honden en katten

Vermindering van acute intestinale absorptiestoornissen `bij acute diarree of tijdens de daaropvolgende herstelperiode´ met prebiotische gist

DiarreeStop bindt vocht, ondersteunt de natuurlijke, slijmbevattende beschermende barrière van de darm en helpt de door diarree belaste mineralenbalans aan te vullen. Het is rijk aan natuurlijke B-vitamines, sporenelementen en essentiële aminozuren. **DiarreeStop** zorgt ook voor een natuurlijke binding van gifstoffen in het spijsverteringskanaal.

Expert tip: Het kan ook worden gebruikt in combinatie met **DarmActief** ter ondersteuning van dieetgerelateerde diarree.

Samenstelling: dextrose, biergist celwanden (MOS), Dode Zeezout, kweekgraswortel, kaliumchloride, rotsroos. (Koolhydraatbron: dextrose)

Toevoegingsmiddelen/kg: Technologische toevoegingsmiddelen: bentoniet (1m558i) 250 g.
Het totale bentonietgehalte mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van 20000 mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden.

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 6,7%, ruw vet 1,3%, ruwe celstof 1,4%, ruwe as 29,2%, in HCl onoplosbare as 20,0%, kalium 0,99%, natrium 2,65%

Voedingsaanbeveling (poeder): Dagelijks toevoegen aan het voer gedurende 1-7 dagen. ***Katten:*** ca. 1 g/dier. ***Honden:*** ca. 1 g/10 kg lichaamsgewicht. Voor een sneller begineffect kan de voedingshoeveelheid in het begin verdubbeld worden. 1 maatlepel komt overeen met ca. 1 g. Maximumhoeveelheid van **DiarreeStop**: 80 g/kg volledig diervoeder.
Voedingsaanbeveling (capsules): Dagelijks toevoegen aan het voer gedurende 1-7 dagen. ***Katten:*** 2 capsules/dier. ***Honden:*** 2 capsules/10 kg lichaamsgewicht. Voor een sneller begineffect kan de voedingshoeveelheid in het begin verdubbeld worden. Capsule vulhoeveelheid: ca. 0,58 g. Maximumhoeveelheid van **DiarreeStop**: 80 g/kg volledig diervoeder.

Gelijktijdig oraal gebruik met macroliden moet worden vermeden.

Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen.

Additional information

PZN DE 19881380

PZN AT 4942845